RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agreste
Statistique publique
de l'agriculture, de l'alimentation,
de la forêt et de la pêche

INFOS RAPIDES

SEPTEMBRE 2026 N° 123

Données des figures et données complémentaires à télécharger

ISOP – n°06 / 08


Au 20 septembre 2026, le déficit de la pousse de l'herbe atteint 40 %

Au 20 septembre 2026, la pousse cumulée des prairies permanentes est inférieure de 40 % à celle observée à cette date durant la période de référence 1989-2018. Malgré quelques pluies fin août, la sécheresse des sols atteint un niveau exceptionnel et empêche toute reprise de pousse. Le déficit s'accentue dans quasiment toutes les régions.

La pousse de l'herbe demeure très faible

Au 20 septembre 2026, la pousse cumulée des prairies permanentes en France (hors DROM) est inférieure de 40 % à la moyenne observée sur la période de référence 1989-2018. Elle représente 53 % de la production annuelle de référence contre 88 % en moyenne à cette période de l'année. L'absence de pluies significatives empêche toute reprise de la pousse depuis la canicule de fin juin. Sur le dernier mois, seulement 1 % de la pousse annuelle normale a eu lieu contre 9 % en moyenne sur la période 1989-2018. Sur les 4 derniers mois, la pousse de l'herbe représente 7 % d'une année normale contre 50 % en moyenne sur la période de référence.

Figure 1 : Évolution de la production des prairies permanentes




Sources : INRAe, Météo France, SSP

Un déficit important quasi-généralisé

Malgré quelques orages localisés fin août, la sécheresse perdure depuis plusieurs mois sur la quasi-totalité du pays, empêchant toute reprise de la pousse de l'herbe. Seul le pourtour méditerranéen et le nord des Alpes ont connu une pousse normale voire excédentaire sur le dernier mois. Le déficit depuis le début de la campagne est généralisé à l'ensemble du territoire excepté en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans 20 % des prairies permanentes, le déficit depuis le début de la campagne dépasse 50 %, notamment dans le Limousin et en Bourgogne. Dans les trois-quarts des prairies, l'herbe n'a pas poussé depuis plus de 3 mois.


Figure 2 : Indicateur de rendement des prairies permanentes par région fourragère au 20 septembre 2026



Note de lecture : l'indicateur de rendement des prairies permanentes Isop, à une date donnée, est égal au rapport entre la pousse cumulée à cette date depuis le début de la campagne et la pousse cumulée à la même date calculée sur la période de référence 1989-2018. La taille des pastilles est proportionnelle aux surfaces en prairies permanentes de chaque RF.

Sources : INRAe, Météo France, SSP

Figure 3 : Indicateur de rendement des prairies permanentes par région au 20 septembre 2026



Dominique Fiche
SSP - SDSAFA/BSVAE

Sources, définitions et méthodologie

Le système Isop - Informations et suivi objectif des prairies - fournit des estimations de rendement des prairies temporaires et permanentes productives à l'échelle de la région fourragère à partir d'un modèle de simulation (STICS-Prairies). Il est opérationnel sur la quasi-totalité du territoire de la France hors DROM.

Le système Isop calcule les quantités de matière sèche cumulée par hectare au pas de temps journalier sur 209 régions fourragères au total. Les simulations sont effectuées lorsqu'un type de prairies donné – permanentes ou temporaires - couvre plus de 7 000 hectares par région fourragère et 2 000 hectares pour les départements du pourtour méditerranéen. Les prairies productives situées au-dessus de 1 000 mètres peuvent parfois être moins bien représentées à l'échelle des régions fourragères. Le système ne tient pas compte de l'état des sols, ni les inondations, quelles que soient leur durée et leurs causes. Ainsi, la production estimée, en fonction des conditions pédoclimatiques locales, n'est pas forcément exploitable en totalité.

Les résultats de simulation sont extraits au 20 de chaque mois par région fourragère, entre mars et novembre, sous forme d'un rapport à la normale correspondant à la moyenne calculée sur la période 1989-2018.

Isop est le fruit d'une étroite collaboration entre Météo-France, l'INRAe et le SSP.

Cette « Infos rapides » ne traite que des résultats des **prairies permanentes productives.**

Par convention, la production est dite **excédentaire** quand l'indice ISOP dépasse 110, elle est considérée comme **normale** quand l'indice est compris entre 90 et 110, **faiblement déficitaire** si l'indice est compris entre 75 et 90, **fortement déficitaire** si l'indice est inférieur à 75.

Calendrier de publication des infos rapides – Prairies :
Avril - mai - juin - juillet – août - septembre - octobre - novembre

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture. Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :
www.agreste.agriculture.gouv.fr
La guide méthodologique ISOP est disponible dans l'espace « Sources, définitions, méthodes » ou directement sur Guide d'utilisation d'ISOP

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy
75349 Paris

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2026