RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agreste
Statistique publique de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt et de la pêche

INFOS RAPIDES

JUILLET 2026 N° 93

Données des figures et données complémentaires à télécharger

ISOP – n°04 / 08


Au 20 juillet 2026, la pousse de l'herbe devient fortement déficitaire

Au 20 juillet 2026, la pousse cumulée des prairies permanentes est inférieure de 26 % à celle observée à cette date durant la période de référence. Le manque d'eau persistant depuis plusieurs mois, et surtout les périodes successives de canicule, en particulier fin juin, ont ralenti la pousse voire détruit l'herbe dans les prairies. Presque toutes les régions sont déficitaires.

La pousse de l'herbe cumulée est fortement déficitaire

Au 20 juillet 2026, la pousse cumulée des prairies permanentes en France (hors DROM) est inférieure de 26 % à la moyenne observée sur la période de référence 1989-2018. Elle représente 52 % de la production annuelle habituelle contre 70 % en temps normal. Après une première pousse abondante en début de printemps, la production a ralenti avec le manque d'eau. Les températures extrêmes relevées en particulier fin juin et la sécheresse persistante ont depuis un mois détruit l'herbe qui avait repoussé après la première coupe, compromettant même la suite de la campagne à court terme. La pousse cumulée est à ce jour au même niveau que celui observé au 1er juin cette année.

Figure 1 : Évolution de la production des prairies permanentes




Sources : INRAe, Météo France, SSP

La pousse a été déficitaire sur le dernier mois sur l'ensemble du territoire

Au 20 juillet, la pousse cumulée est déficitaire quasiment partout en France, atteignant jusqu'à 50 % de déficit à l'Ouest du Massif Central. Le déficit est important (au moins 25 %) dans la moitié des régions fourragères représentant la moitié des surfaces en prairies permanentes. Dans les Préalpes du nord, la production cumulée est proche de la normale. Le déficit est un peu moins important (souvent 15 à 20 %) au nord d'une ligne reliant Nantes à Reims.
Depuis le 20 juin, la pousse a été déficitaire sur l'ensemble du territoire : seule une petite partie des Alpes bénéficie d'une pousse cumulée supérieure à celle du mois du mois précédent.


Figure 2 : Indicateur de rendement des prairies permanentes par région fourragère au 20 juillet 2026



Note de lecture : l'indicateur de rendement des prairies permanentes Isop, à une date donnée, est égal au rapport entre la pousse cumulée à cette date depuis le début de la campagne et la pousse cumulée à la même date calculée sur la période de référence 1989-2018. La taille des pastilles est proportionnelle aux surfaces en prairies permanentes de chaque RF.

Sources : INRAe, Météo France, SSP

Figure 3 : Indicateur de rendement des prairies permanentes par région au 20 juillet 2026



Dominique Fiche
SSP - SDSAFA/BSVAE

Sources, définitions et méthodologie

Le système Isop - Informations et suivi objectif des prairies - fournit des estimations de rendement des prairies temporaires et permanentes productives à l'échelle de la région fourragère à partir d'un modèle de simulation (STICS-Prairies). Il est opérationnel sur la quasi-totalité du territoire de la France hors DROM.

Le système Isop calcule les quantités de matière sèche cumulée par hectare au pas de temps journalier sur 209 régions fourragères au total. Les simulations sont effectuées lorsqu'un type de prairies donné – permanentes ou temporaires - couvre plus de 7 000 hectares par région fourragère et 2 000 hectares pour les départements du pourtour méditerranéen. Les prairies productives situées au-dessus de 1 000 mètres peuvent parfois être moins bien représentées à l'échelle des régions fourragères. Le système ne tient pas compte de l'état des sols, ni les inondations, quelles que soient leur durée et leurs causes. Ainsi, la production estimée, en fonction des conditions pédoclimatiques locales, n'est pas forcément exploitable en totalité.

Les résultats de simulation sont extraits au 20 de chaque mois par région fourragère, entre mars et novembre, sous forme d'un rapport à la normale correspondant à la moyenne calculée sur la période 1989-2018.

Isop est le fruit d'une étroite collaboration entre Météo-France, l'INRAe et le SSP.

Cette « Infos rapides » ne traite que des résultats des **prairies permanentes productives.**

Par convention, la production est dite **excédentaire** quand l'indice ISOP dépasse 110, elle est considérée comme **normale** quand l'indice est compris entre 90 et 110, **faiblement déficitaire** si l'indice est compris entre 75 et 90, **fortement déficitaire** si l'indice est inférieur à 75.

Calendrier de publication des infos rapides – Prairies :
Avril - mai - juin - juillet – août - septembre - octobre - novembre

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture. Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :
www.agreste.agriculture.gouv.fr
La guide méthodologique ISOP est disponible dans l'espace « Sources, définitions, méthodes » ou directement sur Guide d'utilisation d'ISOP

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy
75349 Paris

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2026